


上徳温泉第1源泉の成分、禁忌症、適応症及び入浴上の注意 (天然温泉かみとくの湯)

男女大浴槽・電気風呂・掛け湯

成分				禁忌症、適応症及び入浴上の注意			
1 源泉名 上徳温泉第1源泉				1 禁忌症 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期 2 適応症(源泉の分析結果に基づく) 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え症、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりぎり、皮膚乾燥症 3 浴用の方法及び注意 ア. 入浴前の注意 (ア) 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。 酩酊状態での入浴は特に避けること。 (イ) 過度の疲労時には身体を休めること。 (ウ) 運動後30分程度の間は身体を休めること。 (エ) 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。 (オ) 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。 (カ) 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。 イ. 入浴方法 (ア) 入浴温度 高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。 (イ) 入浴形態 心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。 (ウ) 入浴回数 入浴開始後数日間は、1日当たり1~2回とし、慣れてきたら2~3回まで増やしてもよいこと。 (エ) 入浴時間 入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3~10分程度とし、慣れてきたら15~20分程度まで延長してもよいこと。 ウ. 入浴中の注意 (ア) 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。 (イ) 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。 (ウ) めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。 エ. 入浴後の注意 (ア) 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること(ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫酸泉等)や必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。) (イ) 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。 オ. 湯あたり 温泉療養開始後おおむね3日~1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。 カ. その他 浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。			
2 泉質 ナトリウム・カルシウム塩化物温泉 (高張性中性低温泉)							
3 源泉温度 28.5℃(気温23℃) 使用位置 42.0℃							
4 温泉の成分							
(1) pH値 7.2							
(2) ラドン含有量 14.8 Bq/kg 4.0×10 <sup>-10</sup> Ci/kg (1.10M・E/kg)							
(3) 試料1kg中の成分及び含有量							
イ. 陽イオン							
成分	ミリグラム(mg)	ミリバル(mval)	ミリバル%(mval%)				
ナトリウムイオン	1.0	0.14	0.04				
ナトリウムイオン	5079	220.9	65.63				
カルシウムイオン	13.1	0.34	0.10				
マグネシウムイオン	6.3	0.35	0.10				
マアネシウムイオン	187.0	15.39	4.57				
カルシウムイオン	1979	98.75	29.34				
ストロンチウムイオン	24.2	0.55	0.16				
アルミニウムイオン	0.1	0.01	0.00				
マンガンイオン	1.8	0.07	0.02				
鉄(Ⅱ)イオン(70%)	3.1	0.11	0.03				
陽イオン計	7295	336.6	99.99				
ロ. 陰イオン							
成分	ミリグラム(mg)	ミリバル(mval)	ミリバル%(mval%)				
ふっ化物イオン	1.7	0.09	0.03				
塩化物イオン	11370	320.7	93.72				
臭化物イオン	34.1	0.43	0.13				
よう化物イオン	0.1	0.00	0.00				
硫酸イオン	978.3	20.37	5.95				
硫酸水素イオン	39.6	0.65	0.19				
陰イオン計	12420	342.2	100.02				
ハ. 遊離成分 非遊離成分							
成分	ミリグラム(mg)	ミリモル(mmol)					
メタけい酸	18.3	0.23					
メタほう酸	57.6	1.31					
非遊離成分計	75.9	1.54					
ニ. 溶存物質(ガス性のものを除く) 19.79g/kg							
溶存ガス成分							
成分	ミリグラム(mg)	ミリモル(mmol)					
遊離二酸化炭素(遊離炭酸)	35.7	0.81					
溶存ガス成分計	35.7	0.81					
ホ. 成分総計 19.83g/kg							
ヘ. その他微量成分							
バリウムイオン	0.1 mg未満	水酸化物イオン	0.1 mg未満				
セクロム	0.005 mg未満	硫酸水素イオン	0.09 mg				
鉄(Ⅲ)イオン(7%)	0.05 mg未満	チオ硫酸イオン	0.1 mg未満				
銅イオン	0.005 mg未満	亜硝酸イオン	0.1 mg未満				
亜鉛イオン	0.005 mg未満	硝酸イオン	0.1 mg未満				
カドミウムイオン	0.0005 mg未満	りん酸イオン	0.1 mg未満				
総水銀	0.0005 mg未満	総ひ素	0.005 mg未満				
鉛イオン	0.001 mg未満	セレン	0.001 mg未満				
5 温泉の分析年月日 令和2年10月15日				4 禁忌症及び適応症決定年月日 令和2年11月19日  愛媛県今治保健所			
6 登録分析機関の名称及び登録番号 愛媛県立衛生環境研究所 第1号							
成分に影響を与える項目							
1 源泉が高張性のため、加水(希釈)しています。							
2 入浴に適した温度に保つため、加温しています。							
3 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。							
4 愛媛県公衆浴場の衛生に関する基準を満たすため、塩素系薬剤を使用しています。							